

ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОКТАГЕЛЯ НА КОЖЕ С ПРИЗНАКАМИ КОНТАГИОЗНОГО МОЛЛЮСКА



КАК ДОЛГО ПРИМЕНЯТЬ?

4-12 недель, до полного регресса высыпаний.

ВАЖНЫЙ СОВЕТ!

Если изменений нет в течение первых 4 недель – это может быть признаком острой фазы заболевания. Продолжайте применять средство дольше. Для развития максимального терапевтического эффекта понадобится больше времени.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

Вирус может долго сохраняться в организме, а скорость улучшений зависит от возраста, длительности заболевания и особенностей иммунитета.

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Основной компонент – **аммония глицирризинат**:

- оказывает прямое противовирусное действие на элементы контактиозного моллюска;
- способствует регрессу некрупных высыпаний без болезненных ощущений;
- предупреждает распространение вируса на другие участки, подавляя его активность.

КАК ПРАВИЛЬНО НАНОСИТЬ?

НЕ ТОЧЕЧНО!

Наносите Октагель:

- на сам элемент,
- на кожу вокруг элемента контактиозного моллюска диаметром не менее 10 см, чтобы предотвратить распространение вируса.



ОКТАГЕЛЬ ПОСЛЕ МЕХАНИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ МОЛЛЮСКА



Если врачом принято решение об удалении элементов, важны правильный уход и профилактика рецидивов.

ОБРАБОТКА КОЖИ НА МЕСТЕ УДАЛЕНИЯ

Экстракт семечек сельдерея способствует снижению раздражения кожи;

Декспантенол – ускоряет заживление;

Аллантоин – способствует ускорению заживления кожи и предупреждению возникновения рубцов;

Тальк – подсушивает и снижает дискомфорт в области деструкции (удаления);

Экстракт календулы – антисептическое и успокаивающее действие.

Дополнительные компоненты помогают уменьшить раздражение после удаления, ускоряют восстановление кожи и предотвращают образование рубцов.

ОБРАБОТКА ОСТАВШИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ

Основной компонент – **аммония глицирризинат**:

- оказывает прямое противовирусное действие на элементы контагиозного моллюска;
- ускоряет исчезновение всех очагов сыпи;
- препятствует распространению вируса на здоровые участки кожи.

КАК НАНОСИТЬ ГЕЛЬ НА ОБЛАСТЬ УДАЛЕНИЯ МОЛЛЮСКА И НА ОСТАВШИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ

Наносите Октагель на место удаленного элемента **и на кожу вокруг – в диаметре не менее 10 см**, чтобы предотвратить повторное распространение вируса.

КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО. ИМЕЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ КОМПОНЕНТОВ.